



DRÆN

I

Mødetidspunktdag den/..... Kl.....

Om indgrebet:

Anlæggelse af dræn i trommehinden vælges ved:

- Gentagne mellemørebetændelser med belastende smerter.
- Længerevarende væske i mellemøret med påvirket høreevne, tale og adfærd.

Anlæggelse af dræn bevirker bedre ventilation af mellemørerne. Slimhinden i mellemørerne vil langsomt normaliseres, således, at slimdannelse aftager. Trommehinden vil efterhånden igen kunne svinge frit, og hørelsen dermed blive normal.

Inden operationen:

Mavesækken skal være tom før bedøvelsen. Det er farligt at bedøve børn med noget som helst i mavesækken. Heller ikke tyggegummi. Derfor: Må man ikke spise de sidste 6 timer før operationen. Man må drikke vand og KUN VAND op til 2 timer før operationen. Ammemælk må gives senest 4 timer før operationen. Astmaspray benyttes som vanligt før operation.

Medbring gerne skiftetøj, da det kan ske af børn tisser i bukserne under bedøvelsen.

Operationen:

Indgrebet, som ca. tager 15 min. Foregår i fuld narkose givet på maske af klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Indsovningen varer under 1 min. Drænet, der er få mm langt, placeres i et lille snit i trommehinden.

Efter operationen:

Barnet skal ikke have noget at spise før hjemkomst. Her må det spise frit.

De første dage efter operationen kan det flyde fra øret med slim, pus eller blod. Flyder det mere end 2

dage, skal øret/ørene dryppes med øredråber i 1 uge. Stopper flådet ikke herefter, kontakt da klinikken. Der er lagt recept på serveren ved operationen, som kun skal købes ved behov. Senere i forløbet kan det flyde fra øret, f.eks. i forbindelse med forkølelse. Det kan give smerter, idet der dannes et vist tryk bag drænet, før det begynder at flyde. Ved voldsomt øreflåd kan drænet desværre udstødes og genanlæggelse blive nødvendig. Ved flåd over 3 dage – ring til klinikken.

Der er sjældent smerter efter operationen, Nogle får hovedpine af narkosegassen i en times tid- giv da gerne barnet, friskt luft. Panodil ved behov. Barnet er som regel friskt allerede samme eftermiddag, men skal holdes hjemme. Dagen efter må barnet godt komme i institution.

Efterforløbet:

Efter ca. 2-3 uger skal barnet møde til kontrol af mellemøre og dræn. Herefter vil vi jævnligt følge ørerne (ca. hver 4. måned), indtil drænet er faldet ud af sig selv, hvilket typisk tager 6-12 måneder. Er mellemørerne herefter blevet raske, er behandlingen slut. Kommer der øreproblemer igen, kan det blive nødvendigt at lægge nye dræn.

Børn må gerne bade og svømme med dræn. Dog ikke dykke - da der så kan komme vand ind i mellemøret gennem drænet. Det kan være hensigtsmæssigt at beskytte ørene, fx med ørepropper (earband), for at hindre smerter eller flåd fra ørene ved svømning. Flyvning er uden problemer med dræn.

